



Biopsie van de prostaat (via de anus)

Binnenkort wordt u verwacht voor een onderzoek van de prostaat. Met behulp van een inwendige echografie (via de anus) kan de prostaat en de omgeving ervan worden afgebeeld. Dit geschiedt met ultrageluidsgolven, waarvan de frequentie zo hoog is dat het geluid door de mens niet te horen is. Er worden dan kleine stukje weefsel van de prostaat afgenomen voor onderzoek.

De prostaat

De prostaat is een klier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis. Bekend is dat prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of ontsteking, maar ook komt vaak voor, dat binnen de prostaat kwaadaardige weefsels ontstaan.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is voorbereiding nodig.

U dient 2 uur van tevoren een antibioticatablet in te nemen. Deze heeft u gekregen toen de afspraak gemaakt werd. Op verzoek van de uroloog zult u soms gestopt zijn met bloedverdunnende middelen (ascal, aspirine, sintrom, marcoumar). Stopt u niet zelf met bloedverdunnende medicatie en doe dit altijd in overleg met de arts.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 - 20 minuten. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u uw onderkleding kunt uittrekken, de bovenkleding houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel.

Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

De uroloog brengt een sonde (kunststof buisje) enkele centimeters in uw anus. Op de sonde wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht.

Het is belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, dan kan het onderzoek zelfs bij kloofjes of aambeien pijnloos verlopen. Via de sonde worden de prostaat en zaadblaasjes in beeld gebracht op een televisiescherm. Op deze manier is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten.

Biopsie

Na het bekijken van de prostaat wordt een biopsie genomen. Bij een biopsie wordt er een stukje weefsel weggenomen met een naald. De uroloog brengt de naald via de endeldarm in de prostaat. De biopsie is in de meeste gevallen niet pijnlijk omdat de binnenkant van uw endeldarm vrijwel gevoelloos is.

Het weefsel wordt daarna onderzocht onder de microscoop. Er kan enkele dagen tot soms weken wat bloed in uw urine of ontlasting of sperma zitten. Het advies is om dan extra te drinken. Bij ongeveer 5% treedt er een bloedvergiftiging op.

Krijgt u koorts boven 38,5C of niet meer kunnen plassen, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Of met de eerste hulp, 's avonds en in het weekend.

Nazorg

Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer na het onderzoek is geen probleem.

Uitslag

Het duurt meerdere dagen voor het onderzoek van de weefsels is verricht. U krijgt voor de uitslag dan een nieuwe afspraak op de polikliniek urologie.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie. De afdeling urologie is voor eventuele vragen telefonisch te bereiken.

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Het telefoonnummer is (0251) 26 56 93.